

LABORATOIR BIOCHIMIE	INSTRUCTION	INS-TC-17-v00
	Plans de réaction en cas d'un incident ou un accident au cours du prélèvement	Date d'application : 22/11/2010 Page : 1/1

Tâches	Conduite à tenir
1- Garrot trop serré, veine trop fine, piqure hésitante	Rassurer le patient Arrêter le prélèvement Comprimer le point de prélèvement
2- Malaise du patient qui reste conscient (Anxiété)	Rassurer le patient Arrêter le prélèvement Comprimer le point de prélèvement Incliner le dossier du fauteuil Relever les jambes du patient
3- Perte de connaissance	Rassurer le patient Arrêter le prélèvement Comprimer le point de prélèvement Incliner le dossier du fauteuil Relever les jambes du patient Faire prévenir un médecin
4- Projection de sang sur la peau et/ou la muqueuse	lavez immédiatement et abondamment à l'eau courante et au savon la zone du corps en contact avec le sang pendant environ 5mn désinfecter avec un antiseptique (Dakin, javel dilué au 1/5, Bétadine dermique pure ou Alcool à 70°)
5- Projection de sang sur les yeux	-Rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et du sérum physiologique pendant environ 10mn -Retirer si c'est le cas, les lentilles de contact -Consulter un ophtalmologue le plus rapidement possible
6- Piqure avec une aiguille souillée ou projection de sang sur peau lésée	- Ne pas faire saigner la blessure - Nettoyer la plaie à l'eau courante et au savon - Tremper ou imbiber la zone blessée dans ou avec un antiseptique pendant environ 10mn - Consulter un médecin immédiatement afin d'évaluer le risque infectieux et envisager un suivi sérologique. - Prélever l'agent victime de l'accident pour les sérologies nécessaires (Hépatite B, C et HIV). - Effectuer les sérologies (B, C, HIV) pour le sang contaminant (sur le sang prélevé ou re prélever le patient après accord). - Faire une déclaration de l'accident auprès du service de médecine de travail dans les 24h.

Poste	Approbateur
Nom	
Signature	